

ĐỀ CHÍNH THỨC  
(Đề thi có 05 trang)

Môn thi: HOÁ HỌC, khối A  
Thời gian làm bài: 90 phút.

Mã đề thi 263

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

**PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):**





**Câu 1:** Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí  $H_2$  (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra  $H_2$  có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

- A. không no (chứa một nối đôi  $C=C$ ), hai chức.
- B. no, hai chức.
- C. no, đơn chức.
- D. không no (chứa một nối đôi  $C=C$ ), đơn chức.

**Câu 2:** Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với  $H_2$  là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư  $Ag_2O$  (hoặc  $AgNO_3$ ) trong dung dịch  $NH_3$  đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

- A. 7,8.
- B. 8,8.
- C. 7,4.
- D. 9,2.

**Câu 3:** Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:



Hai muối X, Y tương ứng là

- A.  $CaCO_3$ ,  $NaHSO_4$ .
- B.  $BaCO_3$ ,  $Na_2CO_3$ .
- C.  $CaCO_3$ ,  $NaHCO_3$ .
- D.  $MgCO_3$ ,  $NaHCO_3$ .

**Câu 4:** Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO,  $Fe_3O_4$  và  $Fe_2O_3$  (trong đó số mol FeO bằng số mol  $Fe_2O_3$ ), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

- A. 0,23.
- B. 0,18.
- C. 0,08.
- D. 0,16.

**Câu 5:** Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

- A. sự khử ion  $Cl^-$ .
- B. sự oxi hoá ion  $Cl^-$ .
- C. sự oxi hoá ion  $Na^+$ .
- D. sự khử ion  $Na^+$ .

**Câu 6:** Số đồng phân este ứng với công thức phân tử  $C_4H_8O_2$  là

- A. 5.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 6.

**Câu 7:** Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

- A. 57 ml.
- B. 50 ml.
- C. 75 ml.
- D. 90 ml.

**Câu 8:** Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

- A.  $CH_3CHO$ ,  $C_2H_5OH$ ,  $C_2H_6$ ,  $CH_3COOH$ .
- B.  $CH_3COOH$ ,  $C_2H_6$ ,  $CH_3CHO$ ,  $C_2H_5OH$ .
- C.  $C_2H_6$ ,  $C_2H_5OH$ ,  $CH_3CHO$ ,  $CH_3COOH$ .
- D.  $C_2H_6$ ,  $CH_3CHO$ ,  $C_2H_5OH$ ,  $CH_3COOH$ .

**Câu 9:** Có các dung dịch riêng biệt sau:

$C_6H_5-NH_3Cl$  (phenylamoni clorua),  $H_2N-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ ,  $ClH_3N-CH_2-COOH$ ,  $HOOC-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ ,  $H_2N-CH_2-COONa$ .

Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

- A. 2.
- B. 5.
- C. 4.
- D. 3.

**Câu 10:** Cho 3,6 gam andehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư  $\text{Ag}_2\text{O}$  (hoặc  $\text{AgNO}_3$ ) trong dung dịch  $\text{NH}_3$  đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, sinh ra 2,24 lít  $\text{NO}_2$  (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

- A.  $\text{C}_3\text{H}_7\text{CHO}$ . B.  $\text{HCHO}$ . C.  $\text{C}_4\text{H}_9\text{CHO}$ . D.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$ .

**Câu 11:** Phát biểu đúng là:

- A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).  
B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.  
C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.  
D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.

**Câu 12:** Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

- A. điện phân nước. B. nhiệt phân  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ .  
C. nhiệt phân  $\text{KClO}_3$  có xúc tác  $\text{MnO}_2$ . D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

**Câu 13:** Khối lượng của một đoạn mạch tơ nylon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nylon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

- A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114.

**Câu 14:** Cho V lít dung dịch  $\text{NaOH}$  2M vào dung dịch chứa 0,1 mol  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  và 0,1 mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

- A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05.

**Câu 15:** Phát biểu **không** đúng là:

- A. Trong dung dịch,  $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$  còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực  $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ .  
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.  
C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.  
D. Hợp chất  $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$  là este của glyxin (hay glixin).

**Câu 16:** Gluxit (cacbohidrat) chỉ chứa hai gốc glucosơ trong phân tử là

- A. saccarozơ. B. tinh bột. C. mantozơ. D. xenlulozơ.

**Câu 17:** Cho các chất:  $\text{Al}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaHS}$ ,  $\text{K}_2\text{SO}_3$ ,  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ . Số chất đều phản ứng được với dung dịch  $\text{HCl}$ , dung dịch  $\text{NaOH}$  là

- A. 4. B. 5. C. 7. D. 6.


**Câu 18:** Phát biểu đúng là:

- A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc là phản ứng một chiều.  
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).  
C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được  $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$ .  
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

**Câu 19:** Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt:  $\text{Na}$ ,  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ,  $\text{CH}_3\text{OH}$ , dung dịch  $\text{Br}_2$ , dung dịch  $\text{NaOH}$ . Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

**Câu 20:** Cho các phản ứng sau:



Số phản ứng trong đó  $\text{HCl}$  thể hiện tính oxi hóa là

- A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.


**Câu 21:** Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

**Câu 22:** Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H<sub>2</sub> phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

- A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560.

**Câu 23:** Cho sơ đồ chuyển hoá sau:



Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

- A. HCHO, CH<sub>3</sub>CHO. B. HCHO, HCOOH.  
C. CH<sub>3</sub>CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH<sub>3</sub>CHO.

**Câu 24:** Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub> vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO<sub>2</sub> (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là

- A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45.

**Câu 25:** Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và 0,04 mol H<sub>2</sub> với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O<sub>2</sub> là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

- A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam.

**Câu 26:** Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

- A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. C. 4,90 gam. D. 6,80 gam.

**Câu 27:** Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO<sub>2</sub> (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)<sub>2</sub> 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

- A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82.

**Câu 28:** Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

**Câu 29:** Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> và Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> phản ứng hết với dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

- A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.

**Câu 30:** Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H<sub>2</sub> (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

- A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2.

**Câu 31:** Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

- A. NH<sub>4</sub>Cl. B. NH<sub>3</sub>. C. HCl. D. H<sub>2</sub>O.

**Câu 32:** Cho cân bằng hoá học: 2SO<sub>2</sub> (k) + O<sub>2</sub> (k)  $\rightleftharpoons$  2SO<sub>3</sub> (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là:

- A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.  
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O<sub>2</sub>.  
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.  
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO<sub>3</sub>.

**Câu 33:** Số đồng phân hidrocarbon thơm ứng với công thức phân tử C<sub>8</sub>H<sub>10</sub> là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

**Câu 34:** Hỗn hợp X có tỉ khối so với H<sub>2</sub> là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O thu được là

- A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam.

**Câu 35:** Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:  ${}_3\text{Li}$ ,  ${}_8\text{O}$ ,  ${}_9\text{F}$ ,  ${}_{11}\text{Na}$  được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

- A. F, O, Li, Na.      B. F, Na, O, Li.      C. F, Li, O, Na.      D. Li, Na, O, F.

**Câu 36:** X là kim loại phản ứng được với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ . Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá:  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  đứng trước  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ )

- A. Fe, Cu.      B. Cu, Fe.      C. Ag, Mg.      D. Mg, Ag.

**Câu 37:** Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

- A. hoà tan  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .      B. trùng ngưng.      C. tráng gương.      D. thủy phân.

**Câu 38:** Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành  $\text{CO}_2$  và  $\text{H}_2\text{O}$  có số mol bằng nhau;

- Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu **không** đúng là:

- A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol  $\text{CO}_2$  và 2 mol  $\text{H}_2\text{O}$ .  
B. Chất Y tan vô hạn trong nước.  
C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.  
D. Đun Z với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc ở  $170^\circ\text{C}$  thu được anken.

**Câu 39:** Cho Cu và dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

- A. amophot.      B. ure.      C. natri nitrat.      D. amoni nitrat.

**Câu 40:** Cho các phản ứng sau:

- (1)  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{t^0}$       (2)  $\text{NH}_4\text{NO}_2 \xrightarrow{t^0}$   
(3)  $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{850^\circ\text{C}, \text{Pt}}$       (4)  $\text{NH}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{t^0}$   
(5)  $\text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{t^0}$       (6)  $\text{NH}_3 + \text{CuO} \xrightarrow{t^0}$

Các phản ứng đều tạo khí  $\text{N}_2$  là:

- A. (2), (4), (6).      B. (3), (5), (6).      C. (1), (3), (4).      D. (1), (2), (5).

**Câu 41:** Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm  $\text{HNO}_3$  0,8M và  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

- A. 0,746.      B. 0,448.      C. 1,792.      D. 0,672.

**Câu 42:** Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là

- A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).      B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).  
C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).      D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).

**Câu 43:** Cho sơ đồ chuyển hóa:  $\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_3\text{Cl} \rightarrow \text{PVC}$ . Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V  $\text{m}^3$  khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết  $\text{CH}_4$  chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

- A. 358,4.      B. 448,0.      C. 286,7.      D. 224,0.

**Câu 44:** Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch  $\text{AgNO}_3$  1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá:  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  đứng trước  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ )

- A. 59,4.      B. 64,8.      C. 32,4.      D. 54,0.

**PHẦN RIÊNG** ———— Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II ————  
**Phần I.** Theo chương trình **KHÔNG** phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):

**Câu 45:** Nung nóng m gam hỗn hợp Al và  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí  $\text{H}_2$  (ở đktc);
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí  $\text{H}_2$  (ở đktc).

Giá trị của m là

- A. 22,75                      B. 21,40.                      C. 29,40.                      D. 29,43.

**Câu 46:** Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với  $\text{H}_2$  bằng 12. Công thức phân tử của X là

- A.  $\text{C}_6\text{H}_{14}$ .                      B.  $\text{C}_3\text{H}_8$ .                      C.  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ .                      D.  $\text{C}_5\text{H}_{12}$ .

**Câu 47:** Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

- A. hematit nâu.                      B. manhetit.                      C. xiđerit.                      D. hematit đỏ.

**Câu 48:** Cho các chất sau:  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ ,  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ,

$\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_3$ ,  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ . Số chất có đồng phân hình học là

- A. 2.                      B. 3.                      C. 1.                      D. 4.

**Câu 49:** Cho iso-pentan tác dụng với  $\text{Cl}_2$  theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

- A. 2.                      B. 3.                      C. 5.                      D. 4.

**Câu 50:** Biết rằng ion  $\text{Pb}^{2+}$  trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

- A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.                      B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.  
C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.                      D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.

**Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):**

**Câu 51:** Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol  $\text{CrCl}_3$  thành  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  bằng  $\text{Cl}_2$  khi có mặt KOH, lượng tối thiểu  $\text{Cl}_2$  và KOH tương ứng là

- A. 0,015 mol và 0,04 mol.                      B. 0,015 mol và 0,08 mol.  
C. 0,03 mol và 0,08 mol.                      D. 0,03 mol và 0,04 mol.

**Câu 52:** Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch  $\text{ZnSO}_4$  và điện cực Cu nhúng trong dung dịch  $\text{CuSO}_4$ . Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

- A. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.  
B. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.  
C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.  
D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.


**Câu 53:** Lượng glucosơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

- A. 2,25 gam.                      B. 1,80 gam.                      C. 1,82 gam.                      D. 1,44 gam.

**Câu 54:** Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử  $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$  là

- A. 5.                      B. 6.                      C. 3.                      D. 4.

**Câu 55:** Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng:



Hai chất X, Y lần lượt là:

- A.  $\text{Cu}_2\text{O}$ ,  $\text{CuO}$ .                      B.  $\text{CuS}$ ,  $\text{CuO}$ .                      C.  $\text{Cu}_2\text{S}$ ,  $\text{CuO}$ .                      D.  $\text{Cu}_2\text{S}$ ,  $\text{Cu}_2\text{O}$ .

**Câu 56:** Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

- A. CO và  $\text{CH}_4$ .                      B.  $\text{CH}_4$  và  $\text{NH}_3$ .                      C.  $\text{SO}_2$  và  $\text{NO}_2$ .                      D. CO và  $\text{CO}_2$ .

----- HẾT -----